

**Carte de
Rappel Patient**

Remsima[®]
Infliximab

**Montrez cette carte
à tous les médecins
impliqués dans votre
traitement.**

Nom du patient :

.....
.....

Nom du médecin :

.....
.....

Numéro de téléphone du
médecin :

.....
.....

Date d'instauration du
traitement par Remsima :

.....
.....

Administrations actuelles :

.....
.....

.....

Pharma code area

Assurez-vous d'avoir
également avec vous une
liste de tous les autres
médicaments que vous
utilisez lors de chaque visite
auprès d'un professionnel de
santé.

Liste des autres médicaments :

.....
.....
.....
.....

Liste des allergies :

.....
.....
.....
.....



LM143507-PA001

Demandez à votre médecin
de consigner le type et la
date du (des) dernier(s)
test(s) de dépistage de la
tuberculose (TB) ci-dessous :

Test :

.....

Date :

.....

Résultat :

.....

Il est important que vous et
votre médecin consigniez le
nom et le numéro de lot de
votre médicament.

Nom du médicament :

.....

Numéro de lot :

.....

Cette carte de rappel patient contient des informations importantes de sécurité que vous devez connaître avant et pendant votre traitement par Remsima.

En cas d'utilisation d'une nouvelle carte, veuillez conserver cette carte comme référence pendant 4 mois après votre dernière dose d'Remsima.

Veuillez lire la « Notice » de Remsima attentivement avant de commencer à utiliser ce médicament.

Gardez cette carte sur vous pendant 4 mois après votre dernière dose de Remsima, ou en cas de grossesse pendant au moins 6 mois après la naissance de votre bébé. Les effets indésirables peuvent

survenir longtemps après votre dernière dose.

| Infections |
Avant le traitement par Remsima

- Veuillez informer votre médecin si vous présentez une infection, même si elle est très légère.
- Il est très important d'informer votre médecin si vous avez déjà présenté une tuberculose (TB) ou si vous avez été en contact avec une personne ayant déjà présenté une tuberculose. Votre médecin vous fera subir des tests pour voir si vous avez la tuberculose. Demandez à votre médecin de consigner le type et la date de votre (vos) dernier(s) test(s) de dépistage de la tuberculose sur la carte.

- Veuillez informer votre médecin si vous souffrez de l'hépatite B ou si vous savez ou suspectez que vous êtes porteur du virus de l'hépatite B.

Durant le traitement par Remsima

- Veuillez informer votre médecin immédiatement si vous présentez les signes d'une infection. Les signes incluent de la fièvre, une sensation de fatigue, une toux (persistante), un essoufflement, une perte de poids, des sueurs nocturnes, de la diarrhée, des plaies, des problèmes dentaires, des brûlures à la miction ou des signes « pseudo-grippaux ».

| Grossesse et vaccinations |

- Si vous avez reçu Remsima pendant votre grossesse, il est important d'en informer votre pédiatre avant que votre bébé ne reçoive un vaccin. Votre bébé ne doit pas recevoir de « vaccin vivant », comme le BCG (utilisé pour prévenir de la tuberculose) dans les 6 mois après la naissance.